

Bmab+XELIRI(大腸癌)

委員長	申請医
-----	-----

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称
Bmab+XELIRI(大腸癌)
Bmab+XELIRI(大腸癌)

作成日
2012/10/11

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
大腸癌	進行再発	21	until PD

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	ベバシズマブ(7.5mg/kg)	点滴	day1
2	イリノテカン(200mg/m ²)	点滴	day1
3	カペシタビン(1600mg/m ²)	経口	day1~14

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	グラニセトロン注(3mg/100mL) デキサメタゾン注(9.9mg) ※アプレピタント併用時はDEXは4.95mg	点滴	200mL/h:30分
	②	ベバシズマブ(7.5mg/kg) 生食(100mL) ※初回90分(66ml/h) 2回目60分(100ml/h) 3回目以降30分(200ml/h)へ変更可	点滴	67mL/h:90分
	③	イリノテカン(200mg/m ²) 生食(250mL)	点滴	166mL/h:90分
	④	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分

備考

カペシタビン 1600mg/m²分2(<1.31m²:2100mg/日、1.31~1.49m²:2400mg/日、
1.50~1.68m²:2700mg/日、1.69~1.86:3000mg/日
1.87~2.04m²:3300mg/日、2.05m²≤:3600mg/日)