

nabPTX+GEM(膵臓癌)

委員長

申請医

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称

nabPTX+GEM(膵臓癌)

nabPTX+GEM(膵臓癌)

作成日

2016/02/04

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
膵臓癌		28	until PD

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	ナブパクリタキセル(125mg/m ²)	点滴	day1、8、15
2	ゲムシタビン(1000mg/m ²)	点滴	day1、8、15

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1、8、15	①	グラニセトロン注(3mg/100mL) デキサメタゾン注(6.6mg)	点滴	200mL/h:30分
	②	生食(50mL)	点滴	前後フラッシュ
	③	ナブパクリタキセル(125mg/m ²) 生食(50mL)	点滴	手落とし:30分
	③	生食(50mL)	点滴	前後フラッシュ
	⑤	ゲムシタビン(1000mg/m ²) 生食(100mL)	点滴	200mL/h:30分
	⑥	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分

備考

- ・ラインはPVCフリーのものでなくてOK
 - ・ナブパクリタキセル投与前後は生食でフラッシュ
 - ・ナブパクリタキセルは血液製剤です。
 - ・ナブパクリタキセル減量の目安
 - 通常量 125mg/m²
 - 1段階減量 100mg/m²
 - 2段階減量 75mg/m²
- ※高齢患者やPS不良な患者には1段階減量もしくはbiweeklyでの投与開始を推奨