

TEC+CBDCA+PTX+Bmab(非小細胞肺癌)

委員長

申請医

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称

TEC+CBDCA+PTX+Bmab(非小細胞肺癌)

TEC+CBDCA+PTX+Bmab(非小細胞肺癌)

作成日

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
非小細胞肺癌		21日	until PD

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	アテゾリズマブ(1200mg/body)	点滴	day1
2	ベバシズマブ(15mg/kg)	点滴	day1
3	パクリタキセル(175mg/m ²)	点滴	day1
4	カルボプラチン(AUC6)	点滴	day1

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	グラニセトロン注(3mg/100ml) デキサメタゾン注(9.9mg) ファモチジン注(20mg) クロルフェニラミン注(5mg)	点滴	200mL/h:30分
	②	アテゾリズマブ(1200mg/body) 生食(250mL) ※初回60分(250mL/h)、2回目以降30分(500mL/h)へ変更	点滴	250mL/h:60分
	③	ベバシズマブ(15mg/kg) 生食(100mL) ※初回90分(67mL/h)、2回目60分(100mL/h)、3回目以降30分(200mL/h)へ変更可	点滴	67mL/h:90分
	④	パクリタキセル(175mg/m ²) 5%ブドウ糖液(250mL)	点滴	手落とし:180分
	⑤	カルボプラチン(AUC6) 生食(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	⑥	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
維持療法		4~6コース終了後PDが認められなければ、PDが認められるまで TEC+Bmabにて投与継続		
day1	①	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
	②	アテゾリズマブ(1200mg/body) 生食(250mL) ※初回60分(250mL/h)、2回目以降30分(500mL/h)へ変更	点滴	250mL/h:60分
	③	ベバシズマブ(15mg/kg) 生食(100mL) ※初回90分(67mL/h)、2回目60分(100mL/h)、3回目以降30分(200mL/h)へ変更可	点滴	67mL/h:90分
	④	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分

備考

非扁平上皮の非小細胞癌に使用

day1~3 アプレピタントカプセル併用

パクリタキセル投与時はフィルター付きPVCフリー専用ライン使用

アテゾリズマブ投与時はインラインフィルター付き輸液セット使用